

Старая редакция	Новая редакция
Способ применения и дозы Инстилляции в конъюнктивальный мешок. Лечение послеоперационного воспаления: по одной капле один раз в день. Лечение начинают за 1 день до хирургического вмешательства и продолжают в течение первых 14 дней послеоперационного периода (включая день операции). Лечение неинфекционных воспалительных заболеваний переднего отрезка глаза: по одной капле два раза в день. Курс лечения определяется врачом в зависимости от тяжести состояния.	Способ применения и дозы Местно, в виде инстилляций в конъюнктивальную полость. Лечение послеоперационного воспаления: по одной капле один раз в сутки. Лечение начинают за 1 день до хирургического вмешательства и продолжают в течение первых 14 дней послеоперационного периода (включая день операции). В зависимости от тяжести состояния врачом может быть определен более длительный курс лечения. Лечение неинфекционных воспалительных заболеваний переднего отрезка глаза: по одной

Способ применения и дозы¹

ЛП-002602 от 01.08.2024

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 30.07.2024 № 15646
(Входящий МЗ №4274212)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ
ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

Броксинак®

Капли глазные, 0,09%

Сентисс Фарма Пвт. Лтд., Индия

Изменение № 1

1. Государственный реестр лекарственных средств. https://grls.minzdrav.gov.ru/Grls_View_v2.aspx?routingGuid=e7522d3b-7155-4ebd-820b-4331821b9904

Старая редакция	Новая редакция
По данным исследования у кроликов с использованием радиоактивно-меченного бромфенака максимальная концентрация после местного применения наблюдается в роговице, высокая - в конъюнктиве и водянистой влаге глаза, низкая - в хрусталике и стекловидном теле.	По данным исследования у кроликов с использованием радиоактивно-меченного бромфенака максимальная концентрация наблюдалась в водянистой влаге и большинстве тканей глаза через 2 часа после инстилляций. Самые высокие концентрации были в роговице, конъюнктиве и склере. Аналогичные количества были обнаружены в водянистой влаге, иридоцилиарной зоне, сосудистой оболочке и, в несколько меньшей степени, в
<u>Метаболизм</u> По результатам исследования in vitro, основной метаболизм бромфенака осуществляется ферментом CYP2C9, который отсутствует в иридоцилиарной зоне, сетчатке и сосудистой оболочке. Уровень этого фермента в роговице составляет менее 1% по сравнению с соответствующим печеночным уровнем.	сетчатке. Значительное проникновение и поддающиеся измерению количества бромфенака были обнаружены во всех образцах через 24 часа, включая сетчатку.

Фармакологические свойства. Фармакокинетика. Распределение¹

ЛП-002602 от 01.08.2024

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 30.07.2024 № 15646
(Входящий МЗ №4274212)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ
ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

Броксинак®

Капли глазные, 0,09%

Сентисс Фарма Пвт. Лтд., Индия

Изменение № 1

1. Государственный реестр лекарственных средств.
https://grls.minzdrav.gov.ru/Grls_View_v2.aspx?routingGuid=e7522d3b-7155-4ebd-820b-4331821b9904